



Vergleichsfotos Prä- und Post-OP

Die Korrektur sollte ausschließlich die hypertrophen Naben zur kosmetischen Verschönerung entfernen (grüne Kennlinie). Linksseitig ist nach dem Eingriff ca. 1 cm Restvorhaut verblieben, rechtsseitig ca. 2 cm, auf die Unterseite zum Hoden hin auf 0 cm fallend.

Prä-OP



Post-OP



Auf dem Foto rechts wird ersichtlich, wie nächtliche Erektionen die Nähte linksseitig komplett aufgerissen haben.

Prä-OP



Post-OP



Vor dem Eingriff hatte mein Genital im erigierten Zustand eine Länge von etwa 16 cm. Nach dem Eingriff sind es ca. 10 cm mit starker Derivation nach links. Hierbei wird die Haut an der Wurzel unterhalb der Schafthaut stark nach vorne gezogen. Unterhalb der Kennlinie auf dem rechten Foto beginnt bereits der von mir hier rasierte haarige Schaft.

nicht erigiertes Glied Prä-OP



erigiertes Glied Post-OP



Auf dem linken Foto wird ersichtlich, dass die Vorhaut auf der Unterseite vollständig bis zum Hoden entfernt wurde. Rezidivierende Entzündungen müssen dauerhaft mit Corticosteroid-Salbe behandelt werden. Das rechte Foto zeigt die verbliebene Restvorhaut mit Kennlinie zum Übergang zur rasierten Haut an der Wurzel.



Weitere Fotos der Verstümmelung

